

유카본정

일 반 의 약 품
분류번호 : 02380



※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 약과 함께 보관하십시오.

[원료의약품 및 분량] 1정(500mg) 중

* 유효성분 : 약용탄(KP)180.00mg 센나엽(EP) 105.00mg 황(KP) 50.00mg
대황엑스(DAB) ...25.00mg 박하유(EP) 0.50mg 회향유(EP) 0.50mg

* 유효성분 이외의 첨가제 : 백당, 카올린, 탈크, 아라비아고무

[성상] 회색~흑색(검정색)의 양면이 볼록한 원형의 정제

[효능·효과] 때때로 발생하는 변비

[용법·용량] 성인 : 1회 1~2정을 1일 1~3회 식사 중 또는 식후에 많은 양의 물과 함께 복용한다.
강한 배변 촉진 작용의 목적으로 사용시에는 저녁 용량을 3~4정으로 늘릴 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 대해 과민반응이 있는 사람
2) 급성 복부(배부분) 질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등)환자 3) 장폐색(창자막힘) 환자 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 5) 12세 미만의 소아 6) 심한 탈수환자(수분 균형 유지 및 전해질 균형 유지에 심한 이상이 있는 경우)

2. 다음과 같은 사람은 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 심한 복통 또는 구역, 구토환자
2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 소화기계 : 심한 복통, 구토, 설사 등.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 자극성 완하제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비 약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다. 3) 이 약물은 운전 또는 기계조작을 하는데 영향을 주지않는다.
4) 이 약을 장기간 과도하게 복용하면 체액 손실 및 저칼륨혈증, 고나트륨혈증 등의 전해질 이상이 나타날 수 있다.

5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[저장방법] 차광 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 **[포장단위]** 100정/상자(10정/PTPX10), 10정/상자(10정/PTP)

■ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. ■ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오. ■ 본 제품은 공정거래고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ■ 구입 시 사용기간이 경과되어 있거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ■ 의약품 정보 및 이 첨부문서 작성 일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 및 자사홈페이지 (<http://www.glrubicon.co.kr>), 또는 소비자상담실(031-382-7694)에서 확인하실 수 있습니다. ■부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품 안전관리원 (Tel. 1644-6223)

문서작성(개정)년월일 : 2020.10.8

[제조원] F.TRENKA Chem. -pham. Fabrik. Ges.m.b.H. A-1040 Vienna. Goldeggasse 5. 1040 Austria
[수입판매원] 지엘루비콘(주) 경기도 안양시 동안구 평촌대로 386 3층 (비산동)